

Publicata in M. Of. nr. 490/ 17.07.2012

Decizie CMDR nr. 55/ 30.06.2012
pentru modificarea anexei la Decizia Consiliului național al Colegiului Medicilor Dentiști
din România nr. 10/2007 privind conținutul minim al trusei de urgență pentru
cabinetul de medicină dentară

În temeiul art. 500 și 502 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare,

Consiliul național al Colegiului Medicilor Dentiști din România adoptă următoarea decizie:

Articolul I

Anexa la Decizia Consiliului național al Colegiului Medicilor Dentiști din România nr. 10/2007 privind conținutul minim al trusei de urgență pentru cabinetul de medicină dentară, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 864 din 18 decembrie 2007, se modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.

Articolul II

Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Președintele Colegiului Medicilor Dentiști din România,
Ecaterina Ionescu

București, 30 iunie 2012.

Nr. 55.

ANEXĂ

(Anexa la Decizia nr. 10/2007)

CONȚINUTUL MINIM AL TRUSEI DE URGENȚĂ
PENTRU CABINETUL DE MEDICINĂ DENTARĂ

1. APARATURĂ ȘI MATERIALE

Obligatorii

- | | |
|--|----------|
| 1. Tensiometru | 1 buc. |
| 2. Stetoscop | 1 buc. |
| 3. Garou | 1 buc. |
| 4. Feșe | 3 role |
| 5. Bandă adezivă | 2 role |
| 6. Soluție polividon-iodat ¹ sau clorhexidină ² pentru tegumente | 1 flacon |
| 7. Perfuzoare pentru soluții cristaline | 2 buc. |
| 8. Canule intravenoase 20 G | 2 buc. |
| 9. Seringi 5 ml sterile | 5 buc. |
| 10. Seringi 10 ml sterile | 5 buc. |

¹ BETADINE, IODINA, IODOSEPT, POLIODINE.

² HIBISCRUB, HIBITANE, CLORHEXIN, DESMANOL.

Facultative

- | | |
|--|--------|
| 1. Butelie de oxigen cu reductor de presiune și sistem de administrare (canulă nazală sau mască) | 1 buc. |
| 2. Balon de resuscitare (autogonflabil) cu mască | 1 buc. |
| 3. Pipă oro-faringiană (nr. 3,4) | 2 buc. |

2. MEDICAMENTE

Nr.	DCI3	Forma farmaceutică	Cantitatea	Observații
1.	Nitroglicerină⁴ sau Nitroglicerină⁵	Cp 0,5 mg sau Cp 0,65 mg	1 flacon (40 cp)	1 cp sublingual în criza de angina pectorală, infarct miocardic acut, edem pulmonar acut cu TAS > 100 mg Hg. Se poate repeta la 5 min. (3-4 capsule). Atenție la valabilitate! (6 luni)
		Aerosol 0,4 mg/doză	1 flacon (10 g)	2 pufuri sublingual în loc de 1 cp de Nitroglicerină
2.	Enalapril⁶	Tablete 10 mg	10 buc.	1 comprimat sublingual, pentru scăderea TA
3.	Acid acetilsalicilic⁷	Capsule 500 mg	10 buc.	1/2 cp mestecat în cazul suspiciunii de infarct miocardic acut
4.	Furosemid⁸	Fiole 20 mg/ 2 ml	10 buc.	IV, pentru reducerea TA
5.	Adrenalină	Fiole 1mg/ 1 ml	5 buc.	Indicată în cazul șocului anafilactic cu iminență de stop cardiac. Se folosește numai soluție diluată cu ser fiziologic (1 fiolă în 10 ml). Se injectează câte 3 ml SC sau intralingual la 5 min. până la obținerea unei TAS > 90 mm Hg. Calea IV se va folosi numai în situații extreme sau în condițiile monitorizării ECG (se folosesc aceleași doze).
6.	Hidrocortizon Hemisuccinat⁹	Flacoane 100 mg, fiole 25 mg	2 g (20×100 mg sau 80×25 mg)	Se administrează IV rapid (bolus) în cazul reacțiilor alergice acute, al crizei astmatice sau al crizei Addisoniene.
7.	Clemastinum¹⁰ sau Prometazină¹¹	Fiole 2 mg/ 1 ml	10 buc.	IM sau IV lent în cazul reacțiilor alergice
		Fiole 50 mg/ 2 ml	10 buc.	IM în cazul reacțiilor alergice Nu se injectează IV.
8.	Cimetidină¹² sau Ranitidină¹³	Fiole 200 mg/ 2 ml	5 buc.	1 fiolă IV lent asociată antihistaminicelor H1 (Clemastinul, Prometazina) și Hidrocortizonului în cazul reacțiilor alergice grave
		Fiole 50 mg/ 2 ml	5 buc.	
9.	Clorură de sodium 9‰	Fiole 10 ml	5 buc.	Ca solvent
10.	Clorură de sodium 9‰	Pungi 500 ml	2 buc.	Se administrează IV.
	Glucoză 10‰	Pungi 500 ml	1 buc.	Se administrează IV în cazul hipoglicemiilor severe sau dacă alimentația orală este imposibilă.

11.	Ketorolac ¹⁴	Cp 30 mg	5 buc.	Oral
12.	Drotavertin ¹⁵	Cp 40 mg	10 buc	Oral, în caz de dureri colicative
13.	Amoxicilină ¹⁶	Cp 500 mg	5 buc.	2 g PO pentru profilaxia infecțiilor locale și a endocarditei bacteriene
14.	Clindamicină ¹⁷	Cp 150 mg sau 300 mg	4 buc.	600 mg PO pentru profilaxia infecțiilor orale și a endocarditei bacteriene

³ Denumire chimică internațională (denumirile comerciale, dacă sunt diferite de DCI, vor fi listate în subsol, cu majuscule).

⁴ NITROGLICERINA.

⁵ MAYCOR NITRO SPRAY, NITROMINT.

⁶ ENAP.

⁷ ASPIRINĂ.

⁸ FURORESE, LASIX.

⁹ FLEBOCORTID, HIDROCORTIZONE, HIDROCORTIZONE NATRIU SUCCINAT.

¹⁰ TAVEGYL.

¹¹ ROMERGAN.

¹² HISTODIL.

¹³ ZANTAC.

¹⁴ KETOROL, KETRODOL, TORADOL.

¹⁵ NO-SPA.

¹⁶ DUOMOX, E-MOX, EPHAMOX, MOXILEN, OSPAMOX.

¹⁷ DALACIN C, CLINDAMICIN, KLINDAN, LANACINE